



Общероссийская общественная организация  
**АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ-ОФТАЛЬМОЛОГОВ**

Научно-практическое заседание  
Экспертного Совета по глаукоме

**Клинические рекомендации, как гарант качества и безопасности медицинской помощи пациентам с глаукомой**

3 июня 2021

<b>09:20 – 09:30</b>	Подключение участников
<b>09:30 – 10:55</b>	Заседание Экспертного совета
<b>10:55 – 11:10</b>	Перерыв
<b>11:10 – 12:30</b>	Заседание Экспертного совета
<b>12:30 – 13:00</b>	Дискуссия

**Председатели:** Петров С.Ю., д.м.н., начальник отдела глаукомы ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца», Золотарёв А.В., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского»

**Секретари:** к.м.н. Голубев С.Ю., д.м.н. Карлова Е.В.

**Благодарим наших партнеров:**



**ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯ**

<b>09:30 – 09:35</b>	Приветственное слово	Нероев В.В.	5 мин
<b>09:35 – 09:55</b>	Современная концепция диагностики и лечения глаукомы	Петров С.Ю.	20 мин
<b>09:55 – 10:15</b>	Соответствие оказываемой специализированной медицинской помощи пациентам с глаукомой клиническим рекомендациям (КР 96/1 «Глаукома первичная открытоугольная») в субъектах Российской Федерации	Малишевская Т.Н.	20 мин
<b>10:15 – 10:35</b>	Возможности и препятствия выполнения клинических рекомендаций по ведению пациентов с глаукомой в реальной клинической практике	Золотарев А.В.	20 мин
<b>10:35 – 10:55</b>	Роль клинических рекомендаций в практике врача амбулаторного приема. Желаемое и действительное. Есть ли противоречия?	Фурсова А.Ж.	20 мин
<b>10:55 – 11:10</b>	Перерыв		15 мин
<b>11:10 – 11:30</b>	Лазерная хирургия глаукомы. Проблемы и решения.	Юрьева Т.Н.	20 мин
<b>11:30 – 12:30</b>	Информационный блок: – Патогенетический подход к ведению пациентов с глаукомой (Аллерган СНГ САРЛ) – Стратегии гипотензивной терапии при офтальмогипертензии (РОМФАРМ) – Практический опыт применения бесконсервантных препаратов в терапии глаукомы (АКРИХИН) – Тактика ведения пациентов с вторичной глаукомой при увеитах (Солофарм)	Голубев С.Ю. Коновалова О.С. Антонов А.А. Ермакова Н.А.	15 мин 15 мин 15 мин 15 мин
<b>12:30 – 13:00</b>	Дискуссия. Разное.		30 мин




КАЖДЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 1 ММ РТ. СТ. УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ГЛАУКОМЫ НА 19%<sup>1</sup>

**ПЕРЕВОД ПАЦИЕНТОВ С ФК АПГ+ББ НА ТАПТИКОМ® ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ВГД<sup>2</sup>**

**ДАННЫЕ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ**

Снижение ВГД от исходных значений во время заключительного визита (через 4–16 недель) при использовании препарата Таптиком® после переключения с других комбинированных препаратов с фиксированными дозировками действующих веществ<sup>2</sup>



ВГД – внутриглазное давление; SD, standard deviation – стандартное отклонение; ФК – фиксированные комбинации; АПГ – аналоги простагландинов; ББ – бета-адреноблокаторы  
1. Balwantray C, Chauhan, Frederick S, Mikelberg, et al. Canadian Glaucoma Study Arch Ophthalmol. 2008;126(8):1030-1036. 2. Pillunat LE et al. Clin Ophthalmol 2017;11:1051-64.

**КАПЛИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.**  
**Регистрационный номер:** ПТ-0030372. **Торговое название:** Таптиком®. **Международное непатентованное название:** тафупрост + тимолол. **Лекарственная форма:** капли глазные. **Фармакотерапевтическая группа:** Противоглаукомное средство комбинированное (простагландин F2-альфа аналог синтетический + бета-адреноблокатор). **Фармакологические свойства.** Фармакодинамика. Таптиком® – лекарственный препарат, содержащий фиксированную комбинацию двух действующих веществ – тафупроста и тимолола. Оба действующих вещества оказывают антургальное давление (ВГД), взаимно усиливая действие друг друга, в результате чего эффект снижения ВГД при применении комбинированного препарата более выражен, чем эффект каждого из действующих веществ в отдельности. **Показания к применению.** Снижение внутриглазного давления (ВГД) у взрослых пациентов с открытоугольной глаукомой или закрытоугольной глаукомой при недостаточной реакции на местную терапию препаратами группы бета-адреноблокаторов или аналогов простагландинов в случаях, когда показана комбинированная терапия, а также у пациентов, у которых ожидается улучшение переносимости лечения за счет применения глазных капель, не содержащих консервантов. **Противопоказания.** Гиперчувствительность к тафупросту, тимололу или любому из компонентов препарата; Синдром повышенной реактивности дыхательных путей, включая бронхиальную астму или анамнез бронхиальной астмы, тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких; Синусовая брадикардия, синдром слабости синусового узла, включая синусовую блокаду I и II степени без кардиостимулятора; Демпинг-реакция; сердечная недостаточность; кардиогенный шок. Возраст до 18 лет (нет данных клинического применения); Беременность; Грудное вскармливание. **С осторожностью.** Таптиком® следует применять с осторожностью в связи с ограниченным опытом применения у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью; у пациентов с аритмией, парасимпатрическим синдромом зрительной капсулы хрусталика или имплантацией хрусталика в переднюю камеру глаза, псевдоэкзофтальмом или пигментной глаукомой, а также у пациентов с установленными факторами риска развития кистозного макулярного отека или иридоциклита. Отсутствует опыт применения тафупроста при неактивной, закрытоугольной, узкоугольной и врожденной глаукоме. Препарат также следует применять с осторожностью у пациентов с заболеваниями роговицы (может вызывать синдром «сухого глаза»), сердечно-сосудистыми заболеваниями (исключая болезнь сердца, спонгиоз (Тиннелла), сердечную недостаточность, артериальную гипертонию I степени), нарушениями периферического кровообращения (при тяжелой форме болезни Рейно или синдрома Рей-но), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) легкой и средней тяжести (применение препарата возможно только если ожидаемая польза превышает потенциальный риск), избыточным течением сахарного диабета или спонтанной гипогликемией (поскольку бета-адреноблокаторы могут скрывать клинические признаки и симптомы острой гипогликемии), сопутствующим лечением бета-адреноблокаторами (при приеме внутрь и в виде глазных капель). **Беременность, период лактации и фертильность. Грудное вскармливание.** С целью предосторожности не рекомендуется грудное вскармливание детей, если матери требуется терапия препаратом Таптиком®. **Способ применения и дозы.** Препарат предназначен только для офтальмологического применения. Рекомендуемая доза – одна капля препарата Таптиком® в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) один раз в сутки. **Побочное действие.** Наиболее часто встречаемыми побочными эффектами, связанными с препаратом, являются: ощущение жжения, покраснение и зуд. У 7% пациентов, была проведена конъюнктивит, в большинстве случаев легкой степени. Перед применением препарата необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом! **Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить свои претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по следующему адресу:** Московская представительство компании «АО Сантен» (Финляндия). Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, офис 402, г. Москва, Россия, 105064, тел. представительств: +7 (495) 980-80-79, тел. горячей линии: +7 (495) 677-60-85 (для сообщений о побочных эффектах и запроса медицинской информации профессионалами здравоохранения), адрес электронной почты: medinfo@santent.ru

ООО «САНТЭН»: Россия, 105064, Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 19, офис 402, +7 (495) 980 8079. [www.santent.com](http://www.santent.com)



ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ



**ПРОТИВО-ГЛАУКОМНЫЙ ПОРТФЕЛЬ SOLOPHARM**



Это качественные доступные решения для управления глаукомой от российского производителя

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

ООО «ГРОТЕКС»  
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А  
Тел.: +7 812 385 47 87  
[www.solopharm.com](http://www.solopharm.com)



**ДОРЗОЛАН® соло**  
[ Дорзоламид 20 мг/мл ]

Флакон 5 мл



**ДОРЗОЛАН® экстра**  
[ Дорзоламид 20 мг/мл + Тимолол 5 мг/мл ]

Флакон 5 мл



**ТРИЛАКТАН®**  
[ Латанопрост 0,005% ]

Флакон 2,5 мл



**ТРАВАКСАЛ**  
[ Травопрост 0,04 мг/мл ]

Флакон 2,5 мл

